Tribolium à tête bordée

(Cryptolestes ferrugineus)

Cycle de vie et biologie

Le **tribolium à tête bordée** (souvent confondu avec le Silvain dentelé) est un petit coléoptère de couleur brun acajou. Les œufs, qui varient de 100 à 400 par femelle, sont déposés sur la marchandise infestée. Le développement des larves se déroule à l'extérieur des grains et dure de 5 à 12 semaines selon la température.

- **Taille :** 1,5 à 2,5 mm.
- **Larves :** Jaunâtres et mesurant de 3 à 5 mm.
- **Durée de développement :** 5 à 12 semaines.

Problématique pour l'homme

Le **tribolium à tête bordée** infeste principalement les silos, moulins et entrepôts de céréales, mais aussi les produits dérivés tels que les fruits secs, les graines d'arachides et les produits de presse d'huiles. Il endommage les grains en attaquant les germes, ce qui provoque des pertes économiques importantes.

- **Dommages :** Altération des céréales et produits dérivés.
- **Risques :** Contamination, fermentation, moisissures, et modification du goût des produits.

Que peut-on faire soi-même ?

Pour limiter la prolifération du **tribolium à tête bordée**, il est conseillé de :

- **Contrôler les stocks** de céréales et les produits alimentaires régulièrement.
- **Assurer une bonne ventilation** des espaces de stockage afin de limiter l'humidité.
- **Isoler les denrées infestées** et les éliminer.
- **Appliquer un contrôle thermique** dans les entrepôts infectés.

Notre rôle de désinfestateur

En tant que désinfestateur agréé, nous intervenons pour gérer les infestations de **triboliums** de manière professionnelle.

- **Inspection :** Localisation et évaluation de l'étendue de l'infestation.
- **Traitement :** Utilisation de méthodes de décontamination adaptées (chimiques ou thermiques).
- **Prévention :** Conseils pratiques pour éviter une réinfestation et pour une gestion durable.

Faites appel à nos services pour garantir l'intégrité de vos stocks et la sécurité alimentaire.